

牻牛儿苗科

牻（音同“忙”）牛儿苗科（拉丁学名：*Geraniaceae*）是双子叶植物纲原始花被亚纲的一科。草本，灌木或亚灌木。单叶或复叶，互生或对生，托叶对生。花两性，有时两侧对称。

天竺葵属

牻牛儿苗科天竺葵属 *Pelargonium* L' Herit.，约 250 种，分布于热带地区，主产地为非洲南部，多年生草本、亚灌木或灌木，具浓裂香气。我国引入栽培的约 6 种，无野生种，各大城市均有栽培供观赏用。

天竺葵

学名：*Pelargonium hortorum*），别名洋绣球、石腊红、入腊红、日烂红、洋葵，属牻牛儿苗科，包括约 230 种多年生肉质、亚灌木或灌木植物。天竺葵原产非洲南部，世界各地普遍栽培。



天竺葵幼株为肉质草本，老株半木质化；在西方是很好的装饰窗台的花卉，在欧洲大陆，如多年生草本，高 30-60 厘米。

形态特征：茎直立，基部木质化，上部肉质，多分枝或不分枝，具明显的节，密被短柔毛，具浓裂鱼腥味叶互生；托叶宽三角形或卵形，长 7-15 毫米，被柔毛和腺毛；叶柄长 3-10 厘米，被细柔毛和腺毛；叶片圆形或肾形，茎部心形，直径 3-7 厘米，边缘波状浅裂，具圆形齿，两面被透明短柔毛，表面叶缘以内有暗红色马蹄形环纹。

伞形花序腋生，具多花，总花梗长于叶，被短柔毛；总苞片数枚，宽卵形；花梗 3-4 厘米，被柔毛和腺毛。芽期下垂，花期直立；萼片狭披针形，长 8-10 毫米，外面密腺毛和长柔毛，花瓣红色、橙红、粉红或白色，宽倒卵形，长 12-15 毫米，宽 6-8 毫米，先端圆形，基部具短爪，下面 3 枚通常较大；子房密被短柔毛。

蒴果长约 3 厘米，被柔毛。花期 5-7 月，果期 6-9 月。德奥等国，尤为常见。